

BỆNH SỞI

Trẻ em là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh Sởi rất cao

Bệnh Sởi là gì?

Sởi là bệnh **truyền nhiễm cấp tính**, do virus Sởi gây nên.

Bệnh chủ yếu gặp ở **trẻ em dưới 5 tuổi**.

Bệnh nguy hiểm vì khả năng **lây nhiễm cao**, có thể gây dịch.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong




Triệu chứng khi mắc bệnh Sởi

Sau thời gian ủ bệnh 10-12 ngày, xuất hiện các triệu chứng:

- **Sốt, phát ban, ho khan, chảy nước mũi**
- Đau họng
- **Mắt đỏ**
- Xuất hiện những **đốm Koplik trắng** nhỏ với tâm màu trắng hơi xanh trên nền đỏ bên trong miệng hay trên niêm mạc bên trong của má


Đường lây bệnh Sởi

- Lây qua **đường hô hấp** do tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết mũi họng của bệnh nhân
- Lây gián tiếp qua những đồ vật mới bị nhiễm các chất tiết đường mũi họng của bệnh nhân



Biến chứng

- Viêm thanh quản, thanh quản
- Viêm não- màng não- tủy cấp
- Viêm ruột
- Viêm tai, viêm tai xương chũm...



Nguồn tham khảo

1. <http://benhnhietsdoi.vn/chuyen-de/chi-tiet/benh-soi>
2. <https://vncdc.gov.vn/benh-soi-nd14512.html>

VẮC XIN SỞI

Tiêm vắc xin là biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất để phòng bệnh



Vắc xin Sởi

Sởi là bệnh **phòng ngừa được bằng vắc xin**

Vắc xin sởi được chứng minh an toàn và hiệu quả

Sau khi tiêm chủng, trẻ **có thể gặp một số phản ứng thông thường** như sốt nhẹ, phát ban, sưng và đau chỗ tiêm



Vì sao trẻ 18 tháng tuổi phải tiêm mũi thứ 2

Là cơ hội để tạo miễn dịch cho những trẻ chưa có đáp ứng miễn dịch sau mũi tiêm thứ nhất hoặc chưa được tiêm Sởi

Miễn dịch sau tiêm vắc xin Sởi là **miễn dịch bền vững suốt đời**

Lịch tiêm phòng Sởi

Trẻ cần được tiêm đủ **02 mũi vắc xin Sởi** theo lịch khuyến cáo trong chương trình tiêm chủng mở rộng:

Mũi 1: 09 tháng tuổi (vắc xin Sởi)

Mũi 2: 18 tháng tuổi (vắc xin Sởi-Rubella)

Địa điểm tiêm vắc xin Sởi

Có thể tiêm vắc xin có thành phần Sởi tại:

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Trạm Y tế xã/phường
- Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Xử lý sau tiêm phòng

Cho trẻ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ

Theo dõi trẻ trong vòng 24-48h sau tiêm

Cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ: sốt cao ($>39^{\circ}\text{C}$, khó thở, co giật, tím tái)

